

Formulaire d'envoi de souche

Hospices Civils de Lyon
Centre de Biologie Nord– Bât O
Institut des Agents Infectieux
103 Grande Rue de la Croix Rouse
69317 LYON Cedex 04

Directeur : Pr. François VANDENESCH
Co-directeurs : Pr. Frédéric LAURENT
Dr. Anne TRISTAN
Tél standard IAI : (33) 04 72 07 11 11
Fax :(33) 04 72 07 18 42

Cadre réservé au CNR

PATIENT

Nom (ou étiquette) :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

EXPÉDITEUR

Laboratoire :

Adresse complète :

Nom du biologiste :

Téléphone :

Mail :

SOUCHE isolée de

Type de prélèvement :

Date du prélèvement :

Votre référence souche :

Identification d'espèce :

PRESCRIPTEUR (si autre qu'expéditeur)

Nom :

Service :

Téléphone :

Mail :

DEMANDE D'ANALYSE (à remplir impérativement)

DANS TOUS LES CAS, JOINDRE LES RÉSULTATS DE L'ANTIBIOGRAMME ET L'ENSEMBLE DES TESTS EFFECTUÉS

▪ Facteurs de virulence / identification :

- Détection des gènes codant les toxines superantigéniques, les leucocidines dont la PVL et les exfoliatines
- Recherche de lien de clonalité (*joindre courrier motivant la demande*)
- Identification d'espèce (*joindre résultats des tests déjà réalisés*)

▪ Résistance aux antibiotiques (*joindre résultats de tous les tests déjà réalisés*)

- Détection des gènes *mecA / mecC*
- Détection de sensibilité diminuée aux glycopeptides

Uniquement pour *S. aureus* **si et seulement si** le laboratoire expéditeur a déterminé des CMI en microdilution de la vancomycine et/ou de la teicoplanine > 1 mg/L. Le CNR ne réalise pas de technique de confirmation pour les staphylocoques à coagulase négative.

- Détection de la résistance au linézolide
- Détection de la résistance à la daptomycine
- Autres résistances (préciser) :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (cocher les bonnes réponses)

- Infection nosocomiale
 - Infection communautaire
 - Portage
 - Contexte épidémique (*joindre courrier*)
 - Syndromes toxiques cutanés
 - Éruption bulleuse généralisée
 - Impétigo bulleux localisé
 - Scarlatine
 - Infections nécrosantes
 - Furonculose
 - Récidivante
 - Pneumonie nécrosante
 - Leucopénie
 - Hémoptysies
 - Autre type d'infection, préciser :
 - Choc toxique staphylococcique, préciser les critères diagnostiques
 - Hypotension systolique
 - Fièvre > ou = à 38,9°C
 - Rash diffus maculo-érythrodermique
 - Suivi de desquamation
- Associés à des manifestations :
- Digestives
 - Musculaires
 - Hyperhémie des muqueuses
 - Rénales
 - Hépatiques
 - Hématologiques
 - Neurologiques
 - Période menstruelle
 - Avec utilisation de tampon périodique*
 - Avec utilisation de coupelle*
- * Préciser le modèle :